



RESEAU CRISTAL
EXPERTS EN SANTE ANIMALE


INFLUENZA 2021-2022

POINT SUR LE RENFORT IA

BLONDEL Vincent


CONTEXTE

- ▶ Depuis fin novembre/début décembre: IAHP.
 - ▶ Espèces sensibles: Canard +++ et toutes volailles, plus que l'an dernier
- ▶ Un foyer primaire dans le 32 et un dans le 64 avec peu de diffusion
- ▶ Puis dans les Landes, puis extension au 32, 65 et 64.
- ▶ Quelques cas faune sauvage (31,65)
- ▶ Récemment dans le Cantal et le Lot




CONTEXTE

- ▶ Depuis fin novembre/début décembre: IAHP.
 - ▶ Espèces sensibles: Canard +++ et toutes volailles, plus que l'an dernier
- ▶ Un foyer primaire dans le 32 et un dans le 64 avec peu de diffusion
- ▶ Puis dans les Landes, puis extension au 32, 65 et 64.
- ▶ Quelques cas faune sauvage (31,65)
- ▶ Récemment dans le Cantal et le Lot



- ▶ Très difficile dans le Grand Ouest




- ▶ Quelques situations où les interventions seraient nécessaires:
 - ▶ Des suspicions cliniques
 - ▶ Des prélèvements (Ecouvillons trachéaux et/ou cloacaux) sur des liens épidémiologiques ou les zones touchées pour libération des lots en vue de l'abattage
 - ▶ Les chantiers d'euthanasie des foyers ou des élevages autour (dépeuplement)
 - ▶ ...

Petit point biosécurité



REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE

- Arrivée: se garer au plus loin possible des bâtiments d'élevage, en zone publique. Sortir un pulvérisateur contenant du désinfectant, se désinfecter les chaussures.
- Descendre et se munir d'une paire de surbottes et, si possible, d'une première couche de vêtements (combinaison plus légères (ex: papier)).
- Marcher jusqu'à l'entrée du sas sanitaire.



REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE

Entrer dans
la zone où
sont les
animaux



Entrer dans le
sas (zone sale)



OBSTACLE PHYSIQUE

Il est conseillé d'utiliser un banc facilement désinfectable (ex: plastique)

2 - S'asseoir sur le
banc et laisser ses
chaussures
extérieures en zone
sale et mettre les
chaussures de
l'élevage

REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE



LE SAS TROIS ZONES

Utilisé en filière ponte

OBSTACLES PHYSIQUES

Il est conseillé d'utiliser un banc facilement désinfectable (ex: plastique)

Techniques de prélèvement

QUELS PRELEVEMENTS ET QUAND?

Contexte	Zone	Prélèvements	Laboratoire
Suspicion	Sans objet	20ET + 20EC + Organes (Foie, rate, cœur)	Agréé (public)
Mouvement de palmipèdes vers gavage	Surveillance ou protection	60ET + 60EC par INUAV	Agréé (public) ou reconnu (privé)
Mouvement de palmipèdes vers abattoir	Surveillance ou protection	60ET par INUAV	Agréé (public) ou reconnu (privé)
Mouvement de poulets vers abattoir	Protection seulement	60ET par INUAV	Agréé (public) ou reconnu (privé)
Contrôle pour levée de zone	Surveillance ou protection	20ET + 20EC par INUAV ou par site selon des DDETSPP	Agréé (public)

ET: Ecouvillons trachéaux
EC: Ecouvillons cloacaux

- ▶ Ecouvillons trachéaux: Viser l'entrée du larynx puis descendre dans la trachée



*Photo:
Chambre
d'agriculture
des Landes*

1. Le bec de l'animal est maintenu ouvert d'une main. L'index est sur la partie supérieure du bec.
2. Tirer la langue (celle du canard, pas la votre) avec le pouce
3. Puis l'écouvillon est approché doucement afin de l'introduire dans l'ouverture de la trachée de l'animal
4. Appliquer l'écouvillon sur toute sa surface contre la paroi de la trachée

Attention : parfois le canard reste en apnée et ferme l'entrée du larynx plusieurs secondes

► Ecouvillons cloacaux: Viser le cloaque

*Photo: Chambre d'agriculture
des Landes*




1. Mettre le canard en position physiologique (tête en haut) et lever la queue
2. Dégager le cloaque avec le pouce
3. Insérer l'écouvillon.

Chez les sujets adultes il est possible d'insérer plus profondément l'écouvillon pour récolter une quantité plus importante de matière fécale

Gestion des euthanasies



- ▶ Principe: injection de T61 (ou DOLETHAL) dans le sinus occipital avec une seringue automatique



EUTHANASIE



- Seringue d'injections multiples
- Flacon de T61 branché dessus
- Conseil: l'Ecomatic 0,5mL → Moins c'est sophistiqué, plus c'est robuste!
- Le T61 est plus pratique que le DOLETHAL (moins de dose)
- En aiguille: généralement du 15x15mm
- Dose selon les animaux
 - Canards de 2kg: 0,2 à 0,3mL de T61
 - Canards de 4kg: 0,5mL de T61

EUTHANASIE

Attente de la mort des
animaux puis
transfert en godet

Attrapeurs
dans un parc
d'attrapage

Canards
euthanasiés
sur une table



Le godet est vidé
dans une benne
d'équarrissage

- ▶ Pour les mesures d'habillement et de biosécurité, les agents de la DDCSPP sont présents et bien formés.
- ▶ Ils forment un sas et vous habillent avec deux couches de combinaison, dont la dernière étanche.
- ▶ Quasiment tout est fourni par la DDCSPP

- ▶ Prévoir:
 - ▶ Des bottes, qui sont plus faciles à désinfecter que des chaussures de ville.
 - ▶ Eventuellement, une combinaison en tissu pour rajouter une couche et protéger vos vêtements.

Des questions?